

RÖVIDEN A HPV-RŐL

Milyen betegségeket okoznak a Humán Papillóma Vírusok?

Ennek a víruscsaládnak sok típusa ismert. A HPV jellemzően a bőr, a szájüreg, a légutak, a nemi szervek és a végbél hámrétegében szaporodik. Az egész világon, így hazánkban is elterjedt. Élete során az emberek 50-80 %-a átesik valamilyen HPV fertőzésen. A „nem rákkeltő” típusok szemölcsöket okoznak a bőrön, a külső nemi szerveken. Ezek jóindulatú elváltozások, de igen makacsok, kezelésük kellemetlen, hosszadalmas (ecsetelés, fagyasztás, kimetszés) és gyakran újra kiújulnak. A „rákkeltő” típusok a hámban, nyálkahártyában úgynevezett „rák megelőző” és „rákos” elváltozásokat okozhatnak (méhnyakrák, hüvely-, szeméremtest-, hímvesző- és végbélrák, valamint szájüregi rákok egyes típusai).

Hogyan terjed a fertőzés?

A fertőzés a fertőzött területek érintésével, összedörzsölésével, főleg szexuális úton terjed egyik emberről a másikra (nem zárható ki az esetleges átvitel eszközökkel vagy tárgyakkal sem). Mivel a HPV akár évekig tünetmentesen lappanghat, sem a fertőzött személy, sem közvetlen környezete, partnere nem tud a fennálló fertőzésről, a továbbvitel veszélyéről.

A védőoltásról:

Hazánkban már több, mint 2 éve gyógyszerári forgalomban van a HPV 6, 11, 16, 18-as típusok elleni oltóanyag. A teljes védettség kialakulásához 3 részoltást kell adni fél év alatt. Az oltásokat az orvosi rendelőben egy előre egyeztetett időpontban, előreláthatólag 2009. április-május hónapokban fogják az érintetteknek beadni és a soron következő 2. hónapos illetve 6. hónapos oltás időpontját az oltó orvos határozza meg. Feltétlenül keresse meg gyermeke házi orvosát időpont egyeztetés végett. Az oltás abban az esetben kedvezményes áron hozzáférhető, ha a szülői nyilatkozatban mindhárom részoltást vállalják, mivel a teljes védelmet csak három részoltás biztosítja! Amennyiben csak egy vagy két részoltás történik meg, akkor az oltás költségét (3 db gyógyszerári ára kb. 90.000 Ft) a szülőnek (a gyermek törvényes képviselőjének) visszamenőleg meg kell térítenie!

Egyéb tudnivalók:

A védőoltásnak ritkán lehetnek mellékhatásai: hőemelkedés, láz, a beadás helyén bőrpír, duzzanat, fájdalom. Nagyon ritkán előfordulhat allergiás reakció. A HPV elleni védőoltás a szexuálisan nem aktív, 10-14 éves korosztályban a leghatékonyabb. A védőoltás terheseknek nem ajánlott és az oltássorozat ideje alatt nem javasolt teherbe esni.